



বিঃ স্রঃ--অন্যান্য খাদ্য শয়োর মত তেলবীজের চাহিদা আমাদের রাজে উত্তরেডির বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম অর্থে কম হলে, কম খরচে এর চাষ বাড়াবার সম্ভাবনা আছে। তেলবীজ শয় যথা -সরঘে, জীনা বাদাম, তৈল, তিমি, সূর্যমূর্খী প্রভৃতি। এখানে উন্নত পদ্ধতিতে তেলবীজ চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা হল যা চাষের কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক ফলনের সুযোগ পাওয়া যাবে।

উন্নত পদ্ধতিতে তেলবীজ শয়োর চাষ



-ঃ আর্থিক সহায়তায় :-

কৃষি প্রযুক্তি পরিচালন সংস্থা (ATMA) • পশ্চিম মেদিনীপুর

-ঃ সম্পাদনায় :-

নব কুমার বেজ, বিদ্যম বস্তু বিশেষজ্ঞ (শস্য বিজ্ঞান)

সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র



- প্রকাশনায় -



সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র



কাপগাড়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন- ৭২১৫০৫, পশ্চিমবঙ্গ
দূরভাষ- ০৩২২১-২৬৭২৬৭

Website:- sevabharatikvk.org
E-mail:- sevabharatikvk@yahoo.co.in

তেল বীজ শস্যের উন্নত চাষ পদ্ধতি

তেল বীজের নাম	উন্নত জাতের নাম	মেয়াদ দিন	একর প্রতি বীজের হার (কেজিতে)	বীজ বগনের সময়	সরিতে বীজ বোনার দুরত সেমি	একরে সারের পরিমাণ নাঃ-ফঃ-পঃ (কেজিতে)	একর প্রতি ফসল কুইটাল	শতকরা তেলের ভাগ	বৈশিষ্ট্য
চোরী	অঞ্জনী (বি-৮৮)	৭০-৭৫	২.৫-৩	আর্দ্ধনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ	৩০-১০	২০:১০:২০	৫-৮	৪০	বেটে, জলদি, শাখাবদ্ধল, এ চাষের পর আরও একটি রবিশয় চাষ করা যাব।
	পাখালী (টি ড্রিপ্টি সি-৩)	৮০-৮৫	৫	ঐ	ঐ	ঐ	৮-৫ (অসেট) ৫-৬ (সেচ)	৪০২	৪২লাঙ্গা শাখাবদ্ধল গাছ।
ধ্বেত সরিয়া	বিনয় (বি-৯); সরিয়া (জাই-এস বি ১৯-৭সি)	৯০-৯৫	৫	কার্তিকের ১ম সপ্তাহ থেকে কার্তিকের ২য় সপ্তাহ	৩০-১০	৩২৮১৬৬১৬	৫-৬	৪৬	লম্বা, কম ডাল পালাযুক্ত সেচ প্রযোজন।
	বুমক (এস সি-এ)	৯৫-১০০	৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬-৬.৫	৪৬	লম্বা, ছড়ানো শাখা প্রশাখাযুক্ত গাছ, সেচ প্রযোজন।
	এম-এস-২০৩	১৫-১০০	৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬-৭.৫	৪৬	শীতের নিকে বৃলাযুক্ত ফল, গাছের আকার পিরামিডের মতো, সেচ প্রযোজন।
রাই	মীতা (বি-৮৫)	৯৫-১০০	৫	কার্তিকের ১ম তিন সপ্তাহের মধ্যে কার্তিকের প্রথমার্ধে	৩০-১০	ঐ	৫.৫-৬	৩৮	জলনি জাত সেচ প্রযোজন।
	ভাগিরথি (আর ড্রিপ্টি-০৫১)	১১০-১১৫	৫	ঐ	ঐ	ঐ	৭-৮	৩৮	লম্বা পাছ, চাপা শাখা-প্রশাখাযুক্ত দুটি সেচ দরকার।
	সরবা (আর ড্রিপ্টি-৮৫-৫৯)	১১০-১১৫	৫	কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ হতে অগ্রহায়ণের ২য় সপ্তাহ	ঐ	ঐ	৬.৫-৭	৩৮	দেরিতে বোনার উপযুক্ত শাখা বহুল গাছ দৃষ্টি সেচ দরকার।
তিল	সংযুক্ত অংকে (আর ড্রিপ্টি-৩সি-৩)	৯৫-১০	৫	ঐ	ঐ	ঐ	৮-৫	৪৫	অসেট একাকার উপযুক্ত এবং সার্পী ফসল হিসাবেও করা যায়।
	তিলোত্তমা (বি-৬৭)	৭৫-৮০	৫	ফাল্গুন অর্ধথা ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহ	৩০-১০	২০৮১০৮১০	২.৫-৩.৫ সেচ ৩.৫-৪.৫ অসেট	৪০	কলচে বালীয়া বীজ, শাখাযুক্ত। গোড়া পচাত্তোঠোকা সহনশীলবালীয়া বীজ, প্রাক সরিতে চাষ করা যাব।
	রমা (ইম প্রভ সিসেকসান-৫)	৮০-৮৫	৫	ঐ	ঐ	৩২৮১৬৬১৬	৩.৫-৪.০ অসেট ৪.০-৬সেচ	৪৫	
চীনা বাদাম	জেটি এস-৮	৮০-৯০	৫	ঐ	ঐ	৩২৮১৬৬১৬	১৬.৪-৪.৫	৪৬	বীজের রং সাদা।
	এ.কে. ১২-১৪	১১০-১২০	৪৪ খোসা ছাড়ানো ৪৪ খোসা সহ	ভাস্তুন অধিবা ভাস্তু	৩০-১০	৬:১২:১৮	৮-৯	৪৮.০	বালীয়া রংজে বীজ, ৭-১০ দিন সুষ অবস্থায় থাকে।
	মৃগের প্রগতি (জে-এল-২৪)	১০০-১১০	৫৮ খোসা ছাড়ানো ৮৫	ঐ	ঐ	ঐ	৮-১০	৫০.৭	বড় সমৃজ রংজের পাতা, মসৃণ গুটি, দানার রং গোলালী।
তিসি	জি জি-২	১১০-১২০	৪৪ খোসা ছাড়ানো ৪৪	ঐ	ঐ	ঐ	৮-১০	৪৯	জলনি ফুল আসেন, পাঁচ দুটি দানাযুক্ত, ফুলার রং হালক, বাদামী।
	আই সি এস-৪৪	১১০-১২০	৫	ঐ	ঐ	ঐ	৯-১০	৪৯	
	ট্যাপ-২৪								
সুর্যমুখী	নীলা (বি-৬৭)	১২০-১২৫	৮-৫	কার্তিক মাসের দ্বিতীয়ার্ধে	৩০-১০	১০:৫:৫: সেচ ২০:১০:১০ অসেট	৩-৮	৩৯.৫	ছোট দানা, পোকার উপরবস্থালীল বড় দানা, রোগ পোকা, সহনশীল।
	গরিমা	১২৫-১৩০	৭.৫-৮	ঐ	ঐ	ঐ	৮.৫-৯.৫	৪০	
	কে বি এস এইচ-৪৪	১১০-১১৫	২	অগ্রহায়ণ	৬০-৩০	২৪:৩৬:২৪	৮-৫	৪২.৫	শকের জাত, মূলের বাস ১৮-২০ সেমি
সুর্যমুখী	কে বি এস এইচ-১	৮০-৮৫	৫	ঐ	ঐ	ঐ	৭-৮	৪১.৮	শকের জাত, মূলের বাস ১৮-২০ সেমি
	এম এস এফ এইচ-১৭	৮৫-৯০	৫	ঐ	ঐ	ঐ	৭-৮	৪১.৮	